Utilisation judicieuse pour port prolongé des ÉPI en contexte de pandémie COVID-19 pour l'HSCM, l'HF et l'HJT

Sauf soins intensifs et urgence d'HSCM et les urgences de l'HF et l'HJT

Élément de **l'ÉPI**	**Unités froides** (même en éclosion)	**Unités tièdes** ou patients avec suspicion clinique de COVID	**Unités chaudes** (cohortes de patients positifs dans une même chambre ou un même espace)
Gants	Changer entre chaque patient	Changer entre chaque patient	Changer entre chaque patient
Blouse 	Changer entre chaque patient	Changer entre chaque patient	Garder entre les patients N.B Changer si IMGA[2], souillée ou contact avec patient C. difficile, SARM, EPC[1] ou gastro-entérite
Masque de procédure	Garder entre les patients ainsi qu'au poste	Garder entre les patients consécutifs **RETIRER/CHANGER AVANT** retour au poste	Garder entre les patients consécutifs **RETIRER/CHANGER AVANT** retour au poste
	Toujours changer si souillé ou humide ou après avoir pris soin d'un patient avec : C. difficile, SARM, EPC[1] et gastro-entérite. Port maximal : 4 heures		
N95 si Précautions aériennes contact modifiées (PACM)	N/A	Garder entre les patients consécutifs **RETIRER AVANT** retour au poste	Garder entre les patients consécutifs **RETIRER AVANT** retour au poste
	Toujours changer si souillé ou humide ou après avoir pris soin d'un patient avec : C. difficile, SARM, EPC[1] et gastro-entérite. Port maximal : 8 heures		
Protection oculaire (lunette ou visière)	Garder entre les patients ainsi qu'au poste	Garder entre les patients consécutifs **RETIRER/DÉSINFECTER AVANT** retour au poste	Garder entre les patients consécutifs **RETIRER/DÉSINFECTER AVANT** retour au poste
	Toujours nettoyer lorsque souillée ou après avoir pris soin d'un patient avec : C. difficile, SARM, EPC[1] et gastro-entérite. **Jeter et remplacer si endommagée ou difficulté à voir.**		
Protection oculaire (visière) et **N95**	**Si IMGA[2]** Jeter visière et N95 en sortant de la chambre	**Si IMGA[2]** Jeter visière et N95 en sortant de la chambre	**Si IMGA[2]** Jeter visière et N95 en sortant de la chambre

1 – EPC : entérobactéries productrices de carbapénémases
2 – IMGA : Intervention médicale générant des aérosols (voir liste dans intranet : Prévention des infections<COVID-19)

Service de prévention et de contrôle des infections
Préparé et élaboré par : Dr Jean-Michel Leduc, Chantal Cloutier, Linda Lalande
Version : 30 avril 2020

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Québec