


# Utilisation judicieuse pour port prolongé des ÉPI en contexte de pandémie COVID-19 en CHSLD et sur les unités d'hospitalisation en santé mentale

Autant que possible, regrouper les soins par type de patient et procéder **TOUJOURS** selon la séquence suivante :



Et **JAMAIS** dans cette séquence suivante :



Le poste demeure en tout temps une zone froide même si vous êtes en zone chaude ou en zone tiède. Pour aller au poste, retirer vos gants et votre blouse. Pour votre masque et votre protection oculaire, suivre les consignes dans le tableau.

Élément de l'ÉPI	<b>C<sup>-</sup></b> Patient <b>NON-COVID</b> (même dans les secteurs en éclosion)	<b>C<sup>?</sup></b> Patient en dépistage pour suspicion clinique de COVID	<b>C<sup>+</sup></b> Patient <b>COVID positif</b>
<b>Gants</b> 	<b>CHANGER</b> entre chaque patient et lavez vos mains	<b>CHANGER</b> entre chaque patient et lavez vos mains	<b>CHANGER</b> entre chaque patient et lavez vos mains
<b>Blouse</b> 	<b>CHANGER</b> entre chaque patient	<b>CHANGER</b> entre chaque patient	<b>GARDER</b> entre les patients <u>consécutifs et à proximité</u> C <sup>+</sup> seulement
<b>Toujours changer si souillée ou si contact avec patient C. difficile, EPC<sup>1</sup> ou gastro-entérite</b>			
<b>Protection oculaire</b> (lunette ou visière) 	<b>GARDER</b> entre les patients C <sup>-</sup> ainsi qu'au poste	<b>GARDER</b> entre les patients <u>consécutifs</u> C <sup>?</sup> seulement <b>RETIRER/DÉSINFECTER AVANT</b> retour au poste	<b>GARDER</b> entre les patients <u>consécutifs et à proximité</u> C <sup>+</sup> seulement <b>RETIRER/DÉSINFECTER AVANT</b> retour au poste
<b>Toujours nettoyer lorsque souillée ou après avoir pris soin d'un patient avec : C. difficile, EPC<sup>1</sup> et gastro-entérite. Jeter et remplacer si endommagée ou difficulté à voir.</b>			
<b>Masque de procédure</b> 	<b>GARDER</b> entre les patients C <sup>-</sup> ainsi qu'au poste	<b>GARDER</b> entre les patients <u>consécutifs</u> C <sup>?</sup> seulement <b>REPLACER AVANT</b> retour au poste	<b>GARDER</b> entre les patients <u>consécutifs et à proximité</u> C <sup>+</sup> seulement <b>REPLACER AVANT</b> retour au poste
<b>Toujours changer si souillé ou humide ou après avoir pris soins d'un patient avec : C.difficile, EPC<sup>1</sup> et gastro-entérite. Port maximal : 4 heures</b>			

1 – EPC : Entérobactéries productrices de carbapénémases

Si **IMGA** (intervention médicale générant des aérosols) appliquer les précautions contre la transmission aérienne contact modifiée - port prolongé de l'EPI (PACM) et vous référer au tableau Utilisation judicieuse pour port prolongé des ÉPI en contexte de pandémie COVID-19 en CHSLD et sur les unités d'hospitalisation en santé mentale disponible sur l'intranet (dans la section Prévention des infections COVID-19)