

## **Informations sur les examens.**

Certains examens demandent d'être à jeun d'autres non. De prendre une médication ou de cesser une médication précise. Voici la liste :

### **Examens qui ne demandent aucune préparation :**

- Scintigraphie osseuse.
- Scintigraphie de la moelle osseuse.
- Scintigraphie au gallium.
- Globule blanc à In111.
- Scintigraphie hépato-splénique.
- Recherche d'hémangiome hépatique.
- Recherche de rate accessoire.
- Scintigraphie des glandes salivaires.
- Scintigraphie des parathyroïdes.
- Scintigraphie pulmonaire.
- Scintigraphie testiculaire.
- Veinographie isotopique.
- Scintigraphie cérébrale.
- Perméabilité d'un shunt LCR.
- Scinti rénale au lasix.
- Scinti rénale sous médication.
- Scinti rénale au DMSA.
- Mélanome.
- Ganglion sentinelle.
- Lymphographie.
- Shunt gauche-droit.
- Shunt droit-gauche.
- Ventric isotopique.

### **Examens qui demandent d'être à jeun à partir de minuit :**

- Étude de vidange gastrique, transit oesophagien et reflux.
- Scintigraphie des voies biliaires.
- Recherche d'hémorragie digestive.

## **Examens qui demandent une préparation et/ou arrêt de médication:**

### Scintigraphie thyroïdienne au Tc99m et pancorporelle à I131.

- Examen sur 2 jours.
- Cesser anti-thyroïdiens 1 semaine avant l'examen (ex: PTU, Tapazole, Méthimazole, Mercazole, Thiamazole.)
- Cesser Cytomel 2 semaines avant l'examen.
- Cesser Synthroid 4 semaines avant l'examen.
- Cesser multivitamines 4 semaines avant l'examen (ex: Centrum, Herbalife, Kelpasan).
- Éviter poissons et fruits de mer pendant 2 semaines.
- Attendre 3 à 6 semaines après avoir passé une biopsie ou un scan avec agent de contraste.
- Attendre 3 à 6 mois après avoir passé une angiographie, myélographie et bronchographie.

### Scintigraphie myocardique à l'effort/Persantin + repos.

- Examen sur 2 jours.
- À jeun 4 heures avant l'examen. Patients diabétiques peuvent manger 1 toast et 1 jus.
- À cesser 48 heures avant l'épreuve d'effort/Persantin :  
Café, thé, tisane, boisson gazeuse, boisson énergisantes, produits décaféinés, alcool et chocolat sous toutes ces formes.
- À cesser 48 heures avant l'épreuve d'effort/Persantin :  
Béta-bloqueurs, antihypertenseurs, IECA et anti-angineux, avec l'accord du médecin. Cialis, Viagra, Levitra.
- À cesser 12 heures avant l'épreuve d'effort/Persantin : Nitro-patch
- À cesser 72 heures avant l'épreuve d'effort/Persantin : Aggrenox, Théodur, Théophylline, Unifil.

### Diverticule de Meckel.

- À jeun depuis minuit.
- Prendre 300 mg de Zantac 2 fois par jour pour les 2 jours précédant l'examen et 1 comprimé le matin de l'examen.

OU

- Prendre 600mg de Tagamet 3 fois par jour pour les 2 jours précédant l'examen et 2 comprimés le matin de l'examen.

### Test d'haleine( breath test) pour l'hélicobacter Pylori.

- À jeun 4 heures avant sans eau.
- Pas de tabagisme 2 heures avant l'examen.
- À cesser 1 mois avant l'examen : Antibiotiques, Bismuth, Kaopectate, Pepto-Bismol
- À cesser 14 jours avant l'examen: Inhibiteur de pompe à proton ou Sucralfate.
- À cesser 24 heures avant l'examen : anti-acide et H2 bloqueur.

### Cisternographie radio-isotopique

- Examen sur 2 ou 3 jours.
- À cesser 48 heures avant l'examen : Coumadin;
- À cesser 24 heures avant l'examen : Héparin, Inohep, Aspirine, Plavix.

### Scintigraphie pancorporelle à la Somatostatine.

- Examen sur 2 ou 3 jours.
- À cesser 24 heures avant l'examen: Somatostatine.

### Scintigraphie des surrénales au MIBG.

- Vérifier si allergique à l'iode.
- Examen sur 2 ou 3 jours.
- À cesser 24 heures à 1 semaine avant l'examen les types de médicaments suivant : - les antihypertenseurs, bloqueurs calciques et andrénergiques; les antidépresseurs tricycliques et atypiques; les sympathomimétiques et les antipsychotiques.

### Scintigraphie rénales au Mag3 pré et post Captopril.

- À cesser 24 heures à 1 semaine avant l'examen : les Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine
- À cesser 24 heures avant l'examen : Les diurétiques et les hypotenseurs.